

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ (Τεχνητά δάκρυα)

Κοινή Χημ. Ονομασία	Σύνθεση	Μορφή Κυκλοφορίας	Εμπορική Ονομασία, Εταιρεία	
[-δεν εφαρμόζονται με φακούς επαφής-1 σταγ. x 4] Carbomer [1 σταγ. x 2-4]	Carbomer 0,3% Polyvinylpyrrolidone g.s. (δίχως συντηρητικά)	collyr. monodose	Dacrio Gel®-Alcon	0,5 ml x 20
	Carbomer 0,3% Mannitol 5% Aquae bidest. 71,2%	gel. ophth.	Thilogel®-Thilo	10 g
Polyvinyl Alcohol ± Povidone [1 σταγ. ή 1-2 σταγ. ανάλογα]	Polyvinyl Alcohol 1,4%	collyr.	Liquifilm Tears®- Allergan	15 ml
	Polyvinyl Alcohol 1,4% Povidone 0,6%	collyr. monodose	Refresh®-Allergan	0,4 ml x 30
Polyacrylic	Polyacrylic Acid 0,2%	gel ophth.	Viscoter®-Dispersa	10 g
Parafin-Lanolin	Lanolin Anhydrous liquid Parafin αα 3% Methyl-Paraben Propyl-Paraben αα 0,05% Petrolatum q.s.	ung. ophth.	Duratears®-Alcon	3,5 g
Ρυθμιστικά διαλύματα δεξτρώζης-μεθυλοκυτταρίνης [1-2 σταγ. x όσες φορές απαιτεί- ται για την εξαφάνιση των συμπτωμάτων] ΣΗΜ. Συμβατά με φακούς επαφής.	Dextran-70 0,1% Hydroxypropylmethylcellulose 0,3% (= Hypromellose) [δίχως συντηρητικό]	collyr. monodose	Tears Naturale® free- Alcon	0,6 ml x 30
	Dextran-70 0,1% Hypromellose® 0,3% Polyquad® 0,01% (συντηρητικό)	collyr. (σε ποικιλία αποχρωσεών)	Tears Naturale® II- Alcon	15 ml
Ρυθμιστικά διαλύματα αλάτων	Potassium Chloride 0,075% Sodium Chloride 0,64% Calcium Chloride Dihydrate 0,048% Magnesium Chloride Hexahydrate 0,03% Sodium Acetate Trihydrate 0,39% Sodium Citrate Dihydrate 0,17% Sodium Hydroxide q.s. Water for injection q.s.	collyr.	BSS®-Alcon	
	I. Potassium Chloride 0,744% Sodium Chloride 0,0395% Dibasic Sodium Phosphate 0,0433% NaHCO ₃ 0,219% HCl q.s.	collyr. (ανάμιξη I+II πριν τη χρήση)	BSS Plus®-Alcon	

Κοινή Χημ. Ονομασία	Σύνθεση	Μορφή Κυκλοφορίας	Εμπορική Ονομασία, Εταιρεία	
	II. Calcium Chloride Dihydrate 0,385% Magnesium Chloride Hexahydrate 0,5% Dextrose 2,3% Glutathione Disulfite 0,46% Water q.s.			

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

Σύστημα Εμπορ. Ονομασία, Εταιρεία	Σύνθεση	Ενδείξεις Τρόπος Χρήσης	Μορφή Συσκευασία
I. ΜΑΛΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ			
1) Καθαρισμός: Liprofin [®] , Alcon	Sodium Perborate	Καθαρισμός και απολύμανση με ανάδευση σε θερμοκρασία ≤60°C	envel. powder 2 g
Preflex [®] , Alcon	Hydroxyethyl-cellulose 0,85% Polyvinylalcohol 0,75%	Καθαρισμός καθημερινός	sol. 45 ml
Opti-Zyme [®] , Alcon	Pancreatin	Ενζυματικός καθαρισμός. Συμβατό με όλα τα συστήματα καθαρισμού υπεροξειδίου του υδρογόνου, με Opti-Free [®] ή Softab [®] (δες σχετικά). Εφαρμόζεται με όλους τους τύπους των φακών επαφής.	tabl. efferv. (x4, x12)
Polyclens [®] , Alcon	Poly-2-Undecanoamide 10% (= πολυμερές)	Καθαρισμός καθημερινός για όλους τους τύπους των φακών επαφής. Συνδυάζεται με θερμικά ή χημικά απολυμαντικά.	sol. 24 ml 6 07201
Complete [®] , Allergan	Polyhexamethylene Biguanide ^{*1} Tyloxapol ^{*2} ^{*1} αντιμικροβιακό κυτταρ. μεμβράνας μικροβίων ^{*2} μη ιονικό καθαριστικό επιφάνειας.	Καθαρισμός με ελαφρό τρίψιμο και προσθήκη στη θήκη με παραμονή ≥4 ωρών.	sol.
Ultazyme [®] , Allergan		Πρωτεϊνικός καθαρισμός, μια φορά την εβδομάδα. Προσθέτουμε 1 δισκίο σε θήκη μαζί με Oxysept [®] -1, παραμονή φακών για 20' λεπτά, άδειασμα και προσθήκη Oxysept [®] -2. Αν χρησιμοποιηθή το Oxysept [®] 1 step with Vit. B ₁₂ , το Ultazyme [®] προστίθεται μαζί με το δισκίο Oxysept [®] -2 with Vit. B ₁₂ .	tabl. 15, 427, 10, 10, 427, 10, 10, 427
LC-65 [®] daily cleaner, Allergan		Τρίψιμο στην παλάμη της κάθε επιφάνειας του φακού με 2-3 σταγ. σε κάθε επιφάνεια και ξέπλυμα με Preserved Saline [®] (δες σχετ.). Συνεχίζουμε με απολύμανση μ' όποιο σύστημα χρησιμοποιούμε.	sol.
Hydrocare Fizzy [®] , Allergan		Πρωτεϊνικός καθαρισμός, μια φορά την εβδομάδα. Τοποθετείται 1 δισκίο σε Preserved Saline [®] (δες σχετικά) και αφήνουμε τους μαλακούς φακούς για 15' λεπτά (τους ημίσκληρους 2 ώρες) και συνεχίζουμε με τη διαδικασία απολύμανσης.	

Σύστημα Εμπορ. Ονομασία, Εταιρεία	Σύνθεση	Ενδείξεις Τρόπος Χρήσης	Μορφή Συσκευασία
2) Απολύμανση: Softab-Polyrinse [®] , Alcon	Dichloroisocyanurate Sodium 0,065 mg	Καθημερινή απολύμανση	sol. + tabl. (×30 δόσεις)
Proxoid [®] , Alcon	Proxoid-1: Hydrogen Peroxide 3% Proxoid-2: Catalase 350 U.I./ml	Απολύμανση, ξέπλυμα και φύλαξη.	sol. 250 ml sol. 250 ml
Flexsol [®] , Alcon	Chlorexidine 0,005% Thimerosal 0,001%	Απολύμανση χημική και φύλαξη	sol. 175 ml
Opti-Free [®] , Alcon αποτελείται από: (α) Opti-Free [®] -dailycleaner (β) Opti-Free [®] -sol. (γ) Opti-Free [®] -tabl. (ενζυματικού καθαρισμού) [φακοί μιας χρήσης: α+β φακοί συχνής αντικατάστασης: α+β+γ φακοί κανονικοί: β+γ+α]	Polyquad [®]	(χωρίς ανάγκη ξέπλυντος με ισότονο διάλυμα NaCl). Απολύμανση, φύλαξη και ξέπλυμα μαλακών φακών επαφής όλων των τύπων. Χρήση: -1-2 σταγ. σε κάθε επιφάνεια από daily cleaner και τρίψιμο στην παλάμη για 20'' λεπτά. -1-2 σταγ. σε κάθε επιφάνεια από sol. και τρίψιμο για 1-2'' λεπτά με ξέπλυμα απ' το ίδιο και φόρεμα. Παραμονή στη θήκη με το διάλυμα ≥4 ώρες. -γεμίζουμε τη θήκη με sol. βάζουμε 1 tabl., παραμονή φακών ≥8 ώρες και ξέπλυμα με sol. (εβδομαδιαίος καθαρισμός).	sol. (α) 355 ml sol. (β) 250 ml tabl.
Oxysept [®] 1 step, Allergan	Hydrogen Peroxide 3% (oxysept-1) Catalase (oxysept-2 = Ultrazyme [®])	Απολύμανση και ξέπλυμα. Τοποθέτηση φακών στη θήκη και προσθήκη διαλύματος και 1 tabl., παραμονή για 2 ώρες και χρήση (για όλους τους μαλακούς φακούς, κοινούς, έγχρωμους και μιας χρήσης).	sol. tabl.
Oxysept [®] 1 step with Vit. B ₁₂ , Allergan	Hydrogen Peroxidase 3% (oxysept-1) Catalase Vit. B ₁₂ (oxysept-2)	όπως και παραπάνω, απλά η προσθήκη vit. B ₁₂ στα δισκία χρωματίζει το διάλ. ροζ, θυμίζοντας την προσθήκη τους.	sol. tabl.
Oxysept [®] system, Allergan	Oxysept [®] 1: Hydrogen Peroxide 3% Oxysept [®] 2: Catalase	Παραμονή φακών σε Nr1 20' λεπτά, άδειασμα θήκης, προσθήκη Nr 2, παραμονή 10' λεπτά και χρήση.	sol. sol.
3) Ξέπλυμα: Normal [®] Rinse, Alcon Polyrinse [®] , Alcon	Chlorexidine 0,025% Thimerosal 0,01%	Σε συνδυασμό με διαλύματα χημικής απολύμανσης. Αντενδείκνυται σε συνδυασμό με θερμική απολύμανση.	sol. 250 ml
Preserved Saline Solution [®] , Allergan	Sodium Chloride 0,9% (= φυσιολ. ορός)	Ξέπλυμα και συντήρηση.	sol. monodose (= unitdoses) 30×15 ml
		Ξέπλυμα μετά καθαρισμό με LC-65 [®] (δες I ₁), φύλαξη ή και διάλυση tabl. πρωτεϊνικού καθαρισμού, Hydrocare Fizzy [®] (δες I ₁).	sol.

Σύστημα Εμπορ. Ονομασία, Εταιρεία	Σύνθεση	Ενδείξεις Τρόπος Χρήσης	Μορφή Συσκευασία
II. ΗΜΙΣΚΛΗΡΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ			
1) Καθαρισμός: Opti-Zyme [®] , Alcon	δες μπροστά I ₁	Ενζυματικός καθαρισμός.	
Polyclens [®] , Alcon	δες μπροστά I ₁	Καθαρισμός καθημερινός.	
Soaclens [®] , Alcon	Thimerosal 0,004%	Καθαρισμός καθημερινός και φύλαξη ημίσκληρων και σκληρών φακών επαφής.	sol. 120 ml
LC-65 [®] , Allergan	δες μπροστά I ₁	Καθαρισμός	
Hydrocare Fizzy [®] , Allergan	δες μπροστά I ₁	Πρωτεϊνικός καθαρισμός, κάθε εβδομάδα.	
2) Απολύμανση: Opti-Free [®] , Alcon	δες μπροστά I ₂	Αποστείρωση, φύλαξη και ξέπλυμα.	
All Total System [®] , Allergan		Αποστείρωση και φύλαξη στο διάλυμα για >6ώρες. Για ημίσκληρους και σκληρούς φακούς επαφής.	sol.
3) Ξέπλυμα: Preserved Saline Solution [®] , Allergan	δες μπροστά I ₃	Ξέπλυμα, φύλαξη ή και διάλυση tabl. πρωτεϊνικού καθαρισμού.	
III. ΣΚΛΗΡΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ			
1) Καθαρισμός: Opti-Zyme [®] , Alcon	δες μπροστά I ₁	Ενζυματικός καθαρισμός.	
Polyclens [®] , Alcon	δες μπροστά I ₁	Καθαρισμός καθημερινός.	
Soaclens [®] , Alcon	δες μπροστά II ₁	Καθαρισμός και συντήρηση.	
LC-65 [®] , Allergan	δες μπροστά I ₁	Καθαρισμός.	
Hydrocare Fizzy [®] , Allergan	δες μπροστά I ₁	Πρωτεϊνικός καθαρισμός.	
2) Απολύμανση: Opti-Free [®] , Alcon	δες μπροστά I ₂	Απολύμανση, φύλαξη και ξέπλυμα.	
All Total System [®] , Allergan	δες μπροστά II ₂	Απολύμανση και φύλαξη.	
IV. ΛΟΙΠΑ			
Lens Fresh [®] , Alcon	δίχως συντηρητικά	1-2 σταγ., ενώ φοριούνται οι φακοί επαφής, για ανακούφιση από ερεθισμούς ματιών.	monodose (= unitdoses)